☆予防接種スケジュールの例☆

予防接種のスケジュールは、それぞれの予防接種の望ましい接種時期の例を示しています。
実際に接種する予防接種とスケジュールについては、かかりつけ医などと相談しましょう。
丸囲み文字（①など）はワクチンの種類毎に接種の回数を示しています。（下記表は母子健康手帳を参照）

《定期接種》　病気の免疫をつけるために接種しましょう。（無料）

ワクチン	接種年齢	乳児期										幼児期									学童期			
		2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	12か月	15か月	18か月	19か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上
ヒブ	生後2か月～5歳未満	①	②	③								④												
小児用肺炎球菌	生後2か月～5歳未満	①	②	③								④												
4種混合（DPT－IPV）	生後3か月～7歳半未満		①	②	③									④										
BCG	1歳未満				①																			
麻しん、風しん（MR）	1期：1～2歳未満 2期：年長児											①							②					
水痘（みずぼうそう）	1歳～3歳未満											①②												
日本脳炎	1期：3～7歳半未満 2期：9～13歳未満																①②	③					④ 9～12歳（2期）	
2種混合（DT）	11歳～13歳未満																							① 11～12歳（2期）
子宮頸がん予防ワクチン（HPV）	中学1年～高校1年の女性																							①②③

《任意の予防接種》 保護者のご希望があれば、自費にて免疫をつけましょう。

おたふくかぜ	1歳以上											①							(②)					
B型肝炎（HBV）		①	②		③																			
インフルエンザ	全年齢					毎年①、②（10月、11月等）																		13歳より①
ロタウイルス	1価	①	②																					
	5価	①	②	③																				

◆同じ種類の予防接種の標準接種間隔

ヒブ	① →（27～56日（4～8週間））→ ② →（27～56日（4～8週間））→ ③ →（7～13か月未満）→ ④	・生後2～6か月に開始 ・①～③は生後1歳未満に完了すること
小児用肺炎球菌	① →（27日以上（4週間以上））→ ② →（27日以上（4週間以上）③は1歳未満）→ ③ →（60日以上の間隔 ④は1歳～1歳3カ月未満）→ ④	・生後2～6か月に開始 ・①～③は生後1歳未満に完了すること
4種混合	① →（20～56日（3～8週間））→ ② →（20～56日（3～8週間））→ ③ →（1年～1年半の間隔）→ ④	・生後3カ月に開始

◆違う種類の予防接種の接種間隔

【生ワクチン】 MR(麻しん風しん混合)、麻しん、風しん、BCG 水痘（みずぼうそう）、おたふくかぜ、ロタウイルス	27日(4週間)以上おく →	生ワクチン 又は 不活化ワクチン
【不活化ワクチン】 不活化ポリオ、4種混合、3種混合(DPT)、2種混合(DT) 日本脳炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、インフルエンザ 子宮頸がん予防ワクチン、B型肝炎	6日(1週間)以上おく →	